

Alimentation Corvidés

Pies Bavardes, Corbeaux Freux, Choucas des Tours

A la becquée :

- ◆ Base : croquettes réhydratées Pro Plan Chatons (ou Purina One Chatons pour les découvreurs)
- ◆ Poulet cru saupoudré de calcium ou Myovityl (2 fois par semaine)
- ◆ Œuf battu + thym cuit en omelette (1 fois par semaine)
- ◆ Viande hachée saupoudrée de calcium coupée à moitié germe de blé et de levure de bière (1 fois par semaine)

Après sevrage :

- ◆ vers de farine vivants
 - ◆ ailes ou cuisses de poulet cuites avec os et sans peau,
 - ◆ pâtée insectivore pauvre en fer (Avian insectenpaté), Nutribird Uni Komplet, Orlux Remiline
 - ◆ omelette avec thym et flocons d'avoine
 - ◆ pomme, fève, poivron, noix, haricot vert
 - ◆ riz complet avec huile d'olive
- Compléments :
- levure diététique
 - gélule artichaut/radis noir + Myovityl (1 fois par semaine)

Adultes :

Idem ci-dessus + mixture Lazare (*) 1 fois par semaine

Corneilles noires

A la becquée :

- ◆ Base : poulet cru saupoudré de calcium ou Myovityl + germe de blé + levure de bière
- ◆ Croquettes réhydratées Pro Plan Chatons (ou Purina One Chatons pour les découvreurs) 3 fois par semaine
- ◆ Viande hachée saupoudrée de calcium (2 fois par semaine) Attention à limiter (goutte)

Après sevrage :

- ◆ vers de farine vivants
 - ◆ ailes ou cuisses de poulet cuites avec os et sans peau,
 - ◆ pâtée insectivore pauvre en fer (Avian insectenpaté),
 - ◆ pomme, fève, poivron, noix, haricot vert
 - ◆ riz complet avec huile d'olive
- Compléments :
- levure diététique
 - gélule artichaut/radis noir + Myovityl (1 fois par semaine)

Adultes :

Idem ci-dessus + mixture Lazare (*) 2 fois par semaine agréementée selon pathologie.

* *Mixture Lazare :*

1/4 steak hachée + 2 CàS germe de blé + 2 CàS levure de bière + 3 CàS pâtée insectivore pauvre en fer + 1 gélule phyto artichaut/radis noir + huile d'olive + calcium (ajuster dose selon âge)

Fréquence de nourrissage

Amplitude : 1 heure après le lever du soleil jusqu'à 1 heure avant le coucher du soleil

Avant apparition des retrices : toutes les heures le matin et toutes les 2 heures l'après-midi

Jusqu'à ce que l'oiseau volette : toutes les 2 heures

Puis toutes les 3 heures en laissant à disposition des vers de farines vivants pendant toute la phase d'apprentissage.

Quand l'oiseau mange seul depuis 1 semaine : 3 distributions de nourriture quotidiennes.

Traitement contre les parasites

L'idéal serait de ne traiter qu'après coproculture, si parasitisme avéré.

Pour les juvéniles : traitement assez agressif : à faire uniquement en cas de suspicion d'infestation (oiseau qui 'ronfle', tousse, ...)

1. A l'arrivée :

Ivermectine trans -cutané (sous ailliaire) :

- ♦ pies ou choucas juvéniles : 1 goutte
- ♦ corbeaux ou corneilles juvéniles : 2 gouttes
- ♦ pies ou choucas adultes : 2 gouttes
- ♦ corbeaux ou corneilles adultes : 3 gouttes

2. 3 jours après le traitement Ivermectine :

Panacur liquide 10% : 0,1ml/ j /400g d'oiseau pendant 3 jours consécutifs, dans la ration alimentaire .

Demander l'avis du vétérinaire référent. Pour les coprocultures, ne pas s'affoler outre mesure de la présence de coccidies, courantes chez le corvidé, et non transmissibles à l'homme.

Si parasites externes (sans suspicion de parasitisme interne): poudre Rhodéo.